

Certificate of Analysis

O-Glycosidase

Cat. No.: QPF-004
Lot. No.: ENP40220702
有效期至: 2023年06月

贮藏: 酶及配套试剂储存在-20℃条件下, 避免反复冻融。

活性测试: 在 Glyco 缓冲液 2 体系下, 20μl 反应体系中 2μl O-Glycosidase 在 37℃ 水浴条件下反应 30min, 可使 20μg 重组人卵泡刺激素-CTP 融合蛋白底物 β-亚基分子量比阴性对照的 β-亚基分子量小 1.0KD 以上。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度≥95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2022.07.10



Certificate of Analysis

α 2-3,6,8,9 Neuraminidase

Cat. No.: QPF-005
Lot. No.: ENP50220802
有效期至: 2023年07月

贮藏: 酶及配套试剂置于-20°C。

活力单位定义: 在 37°C, pH5.5 条件下, 以对硝基苯基- α -D-N-乙酰神经氨酸为底物, 1 分钟内催化释放 1 μ mol 对硝基苯酚所需要的酶量定义为 1 个酶活力单位。

活性测试: 在 Glyco 缓冲液 1 体系下, 20 μ l 反应体系中 2 μ l α 2-3,6,8,9 Neuraminidase 在 37°C 水浴条件下反应 30min, 可使 20 μ g 重组人卵泡刺激素-CTP 融合蛋白底物 β -亚基分子量比空白对照的 β -亚基分子量小 1.0KD 以上。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 \geq 95%。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

QC/QA 签字
日期: 2022.08.10



Certificate of Analysis

β1-4 Galactosidase

Cat. No.: QPF-006
Lot. No.: ENP60220701
有效期至: 2023年06月

贮藏: 将酶及配套试剂储存于-20°C。

活力单位定义: 一个酶单位定义为在 pH 5.5 和 37°C 下每分钟水解 1μmol ONP-β-D-吡喃半乳糖苷 (ONPG) 所需要的酶量。

糖苷酶活性测试: 40μL 总反应体系 (4μL 10×Glyco 缓冲液 1、4μL 2mg/mL ONPG 底物溶液、4μL β1-4 Galactosidase 溶液及 28μL 纯化水)，于 37°C 水浴条件下反应 25 分钟后加入 160μL 0.5mol/L Na₂CO₃ 溶液终止反应，混合均匀后于 420nm 波长进行吸光度值检测。同时对比考察样品、上一批次产品及阴性对照 (纯化水)。A₄₂₀ ≥ 0.500，且与上一批次产品的吸光度值差异 < 10%。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 ≥ 95%。

蛋白酶活性: 取 24μg BSA 溶液，加入 2μL 10×Glyco 缓冲液 1，10μL β1-4 Galactosidase，补加纯化水使得反应体系总体积为 20μL，37°C 水浴条件下反应 20 小时。SDS-PAGE 分析 BSA 蛋白无降解，无蛋白酶活性。

本品仅用于科研，不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com



Certificate of Analysis

β -N-Acetylhexosaminidase

Cat. No.: QPF-007
Lot. No.: ENP70220701
有效期至: 2023年06月

贮藏: 将酶及配套试剂储存于-20°C。

活力单位定义: 一个酶单位定义为在 pH 5.5 和 37°C 下每分钟水解 1 μ mol pNP N-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷 (PNP-NAG) 所需要的酶量。

糖苷酶活性测试: 40 μ L 总反应体系 (4 μ L Glyco 缓冲液 1、4 μ L 2mg/mL PNP-NAG 底物溶液、10 μ L 稀释 100 倍后的 β -N-Acetylhexosaminidase 溶液及 22 μ L 纯化水), 先加入底物、Glyco 缓冲液 1 及纯化水后于 40°C 预热 5min, 再加入 10 μ L 稀释 100 倍后的样品、上一批次产品及阴性对照品 (QPF-007 储存缓冲液: 20mM Tris, 0.5M NaCl, 5mM EDTA, pH7.5。)后, 40°C 条件下反应 5min, 加入 160 μ L 0.5M Na₂CO₃ 溶液终止反应, 混合均匀后, 测定 A₄₀₀ 吸收值。A₄₀₀ \geq 0.300, 且与上一批次产品的吸光度值差异 $<$ 10%。

纯度: SDS-PAGE 分析纯度 \geq 95%。

蛋白酶活性: 取 24 μ g BSA 溶液, 加入 2 μ L 10 \times Glyco 缓冲液 1, 10 μ L Rhinozyme[®] β -N-Acetylhexosaminidase, 补加纯化水使得反应体系总体积为 20 μ L, 37 水浴条件下反应 20hr。SDS-PAGE 分析 BSA 蛋白无降解, 无蛋白酶活性。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

